


Coalescência dos pequenos lábios

A coalescência dos pequenos lábios é uma situação adquirida que pode surgir em cerca de 5% das meninas saudáveis, entre os 3 meses de vida e os 6 anos de idade



É uma situação benigna, na maioria das situações assintomática, e auto-limitada

Na coalescência dos pequenos lábios (CPL), existe uma união adquirida entre os pequenos lábios nos genitais da menina

Coalescência dos pequenos lábios

É IMPORTANTE FAZER O EXAME DOS GENITAIS EXTERNOS DA BEBÉ NAS PRIMEIRAS CONSULTAS, PARA DIFERENCIAR DE OUTRAS SITUAÇÕES CONGÊNITAS!

A CPL é, como foi dito, uma situação que habitualmente não traz problemas e que tem tendência para resolver espontaneamente com o crescimento

Não é necessário nenhum exame específico para diagnosticar esta situação, habitualmente basta um exame físico completo

Apesar de não ser consensual o tratamento, quando há sintomas (inflamações locais, obstrução à saída da urina, secreções vaginais) pode ser feito o tratamento local com cremes específicos

Na ausência de resolução, ou na sua recorrência após o tratamento local, está indicada a referenciação à Cirurgia
Pediátrica

Por vezes, são os próprios pais que, na mudança da fralda, notam a diferença nos genitais da bebé/menina - consulta o seu médico assistente!